

Lubion[®] Progesteron 25 mg soluție injectabilă.

Soluție apoasă cu progesteron pentru
sprijinul luteal al ciclului dvs. de FIV

Un ghid pentru injecția subcutanată



Caring Innovation

Cum să utilizați Lubion?

Înainte de a începe prima injecție, spălați-vă mâinile pregătiți o suprafață curată de lucru, pe care să amplasați toate obiectele de care aveți nevoie:

Seringă

Ac scurt de injecție (adesea galben sau gri)

Ac lung de extracție (adesea verde sau roz)

Fiolă de formulă lichidă Lubion®


Coș pentru articole ascuțite



- Atașați acul de extracție mai mare la seringă, lăsând teaca de protecție a acului pe acesta.



- Îndepărtați capacul de protecție din plastic de pe fiola de Lubion®, expunând membrana din cauciuc din partea de sus a fiolei.
- Îndepărtați teaca de protecție de pe acul mai mare.



- Înțepați cu acul membrana din cauciuc din partea de sus a fiolei, împingeți lent acul către fundul fiolei și extrageți lent toată soluția în seringă.
- Scoateți acul și trageți ușor pistonul seringii pentru a vă asigura că nu există lichid rămas în ac.



- Detașați acul de extracție de pe seringă și eliminați-l în coșul pentru articole ascuțite, împreună cu fiola goală de Lubion®.



- Atașați acul de extracție mai mic la seringă, lăsând teaca de protecție a acului pe acesta.



- Îndepărtați teaca de protecție a acului de pe acul de injecție și verificați dacă există bule de aer în seringă.
- Țineți seringă cu acul în sus și loviți ușor seringă cu degetul până când toate bulele se acumulează în partea de sus.



- Apăsăți ușor pistonul seringii până când toate bulele au fost eliminate, iar capătul acului apare o picătură de lichid.

Lubion se administrează prin injecție subcutanată, în abdomen sau în partea superioară a coapsei.



- Când injecția se efectuează abdomen, se recomandă să faceți acest lucru într-o zonă în formă de arc, sub ombilic.
- Deoarece acest produs se administrează în fiecare zi, se recomandă să faceți rotația locului de injecție, astfel încât să nu repetați injecția în același loc.



- Prindeți pielea ferm și introduceți acum la un unghi de la 45° la 90°.



- Eliberați pielea prinsă și injectați tot tratamentul medicamentos, împingând lent și constant pistonul seringii.

Pentru un ghid video complet despre pregătirea și injectarea Lubion, scanați codul QR sau accesați:
www.ibsapharma.co.uk/products/product/lubion



De ce mi-a fost prescris progesteron?

În timpul primei jumătăți a unui ciclu menstrual obișnuit, ovulele ajung la maturitate în structuri denumite foliculi, alcătuite din celule care produc hormoni și înconjoară ovulul, într-un lichid bogat în hormoni. Foliculii produc un hormon numit estrogen, care determină proliferarea (îngroșarea) endometrului sau mucoasa uterului. Femeile au, de regulă, un folicul dominant, care se rupe la jumătatea ciclului, eliberând un ovul. Acest proces se numește ovulație. După ovulație, foliculul gol se transformă într-o structură numită **corpul luteal**, care produce progesteron.

Progesteronul modifică endometrul, transformându-l într-un mediu favorabil pentru acceptarea și nutriția ovulului. Progesteronul menține endometrul și asigură secreția anumitor substanțe care împiedică descompunerea acestuia. Progesteronul afectează sistemul imunitar și astfel, este vital pentru începutul sarcinii și continuarea acesteia.^{1,2}

Dacă ați urmat un tratament prin Tehnici de Reproducere Asistată (TRA), cum ar fi fertilizarea in vitro (FIV), injecția intra-citoplasmică de spermă (IICS) sau după donare de ovule, furnizarea de progesteron suplimentar pentru „**sprijin luteal**” este o practică obișnuită. Acest suport începe curând după prelevarea ovulelor și continuă până când corpul produce suficient progesteron în mod independent, fără a mai necesita sprijin suplimentar.

Referințe

1. Shah NM, Lai PF, Imami N, Johnson MR. Progesterone-Related Immune Modulation of Pregnancy and Labor. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10:198. Publicat în 29 mar. 2019. doi:10.3389/fendo.2019.00198
2. Schumacher A, Costa SD, Zenclussen AC. Endocrine factors modulating immune responses in pregnancy. Front Immunol. Mai 2014;5:196.

Reacții adverse

Dacă vă confrunțați cu orice efecte secundare, discutați cu medicul, farmacistul sau asistenta. Acestea includ orice efecte secundare care nu sunt enumerate în broșura din pachet.

De asemenea, puteți raporta orice efecte secundare direct, prin Yellow Card Scheme la adresa <https://yellowcard.mhra.gov.uk/>.

Prin raportarea efectelor secundare, puteți ajuta prin furnizarea mai multor informații privind siguranța acestui medicament.

